



Faire une friction  
Ou se laver les mains



Mettre le masque chirurgical  
*Si réalisation d'un acte à risque d'aérosolisation\*, port FFP2 :*  
➤ *Vérifier l'absence de fuite du masque en réalisant un FIT-CHECK*



Mettre une coiffe



Mettre les lunettes



Faire une friction

**Afin de gérer au mieux la disponibilité des sur blouses, 3 situations à prendre en compte (1)**

Soins **avec contact rapproché** avec le patient et/ou son environnement  
*Ex : Mise au fauteuil, nursing, lever, coucher*

Soins **sans contact des épaules et bras** avec le patient  
*Ex : Mise au fauteuil, lever, coucher  
Prise de TA, température, saturation, distribution de traitement...*

**Aucun contact** avec le patient ou son environnement  
*Ex : distribution de traitement, distribution plateau repas, prise de TA...*

Tout le corps est en contact avec le patient



Mettre une surblouse

Les avant bras, mains et partie antérieure du corps rentrent en contact



Port d'un tablier plastique

Seules les mains sont en contact

Pas de port de surblouse, ni tablier

**Au nom des précautions « Standard »**



*Si soin mouillant ou aérosolisant :  
mettre un tablier plastique  
impermeable par-dessus la*



*Si risque de contact avec du sang  
ou des produits biologiques :  
mettre une paire de gants à  
usage unique*



*Si risque de contact avec du sang  
ou des produits biologiques :  
mettre une paire de gants à  
usage unique*

(1) L'habillement doit tenir compte du niveau de dépendance du patient /résident et du contact ou non avec l'environnement.

Ainsi un même type de soins peut nécessiter soit une surblouse ou un tablier ou aucune protection de tenue. Il est important de prendre en compte les parties anatomiques qui seront en contact avec le patient ou son environnement



## DESHABILLAGE

### 1. Avant de sortir de la chambre ou de la pièce où se trouve le patient

- Si port de tablier : l'enlever en l'arrachant par devant et en le tirant loin du corps et le jeter dans la poubelle
- Si port de gants, les enlever et les jeter dans la poubelle



Faire une friction

**Si port uniquement d'un tablier sans surblouse, friction des mains et des avant-bras**

- Si port de la surblouse l'enlever en l'arrachant par devant et en le tirant loin du corps



ATTENTION à ne pas mettre en contact l'extérieur de la sur blouse avec ses vêtements

*et la jeter dans la poubelle*



Faire une friction

### 2. En dehors de la chambre ou de la pièce où se trouve le patient

- Enlever les lunettes et les mettre dans un haricot



- Enlever la coiffe délicatement et la jeter dans la poubelle



Faire une friction

**Compte tenu du contexte contraint relatif à la disponibilité des masques, il ne sera pas éliminé après le soin (Durée port masque chirurgical : 4h / APR FFP2 : 8h ; Cf.avis-sf2h-utilisation-masque-14mars2020)**

Le sac poubelle sera fermé par les liens puis mis dans un second sac poubelle (double emballage) et suivra la filière classique des ordures ménagères

(cf. AVIS relatif à la gestion des déchets d'activités de soins (DAS) produits au cours de l'épidémie de Covid-19, en particulier en milieu diffus, Haut Conseil de la santé publique, 19 mars 2020 , p.4)