

HORS CONTACT PATIENT	POUR TOUT CONTACT	SI GESTE A RISQUE D'AEROSOLISATION
<p><b>COIFFE</b> recouvrant les cheveux</p>  <p><b>MASQUE</b> CHIRURGICAL</p>   <p><b>TENUE PROPRE DU JOUR OU TENUE A USAGE UNIQUE</b></p>	<p><b>COIFFE</b> recouvrant les cheveux</p>  <p><b>LUNETTES</b></p>  <p><b>MASQUE</b> CHIRURGICAL</p>   <p><b>SURBLOUSE A MANCHES LONGUES</b></p> <p><b>+ GANTS</b> si risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques, ou les muqueuses du patient, ou si les mains du soignants sont lésées (PRECAUTIONS STANDARD)</p>  <p><b>+ TABLIER IMPERMEABLE</b> si soin mouillant (PRECAUTIONS STANDARD)</p> 	<p><b>COIFFE</b> recouvrant les cheveux</p>  <p><b>LUNETTES</b></p>  <p><b>MASQUE FFP2</b></p>   <p><b>SURBLOUSE IMPERMEABLE A MANCHES LONGUES</b></p> <p><b>+ GANTS</b> si risque de contact avec du sang ou des liquides biologiques, ou les muqueuses du patient, ou si les mains du soignants sont lésées (PRECAUTIONS STANDARD)</p>  <p><b>GESTES A RISQUE :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intubation / Extubation</li> <li>• Ventilation mécanique avec circuit expiratoire « ouvert »</li> <li>• Ventilation mécanique non invasive (VNI)</li> <li>• Aspiration endotrachéale</li> <li>• Fibroscopie bronchique</li> <li>• Kinésithérapie respiratoire</li> <li>• Aérosolthérapie</li> <li>• Prélèvement nasal ou nasopharyngé</li> <li>• Autopsie</li> <li>• Soins dentaires (avec aérosolisation)</li> <li>• EFR (spirométrie et actes réalisés en système non clos)</li> <li>• oxygénothérapie &gt; 6L/min</li> </ul>

**-LE MASQUE EST PORTE 4 HEURES D'AFFILEE-**

**DANS LES UNITES COVID, IL PEUT ETRE DECIDE, POUR DES RAISONS ECONOMIQUES (RATIONALISATION DES MASQUES) DE PORTER UN MASQUE FFP2 PENDANT 4 HEURES AU LIEU D'ALTERNER LES MASQUES EN FONCTION DES SOINS**