NEVER EVENT : COLCHICINE : Erreur d'utilisation

RISQUE

En raison du nombre toujours trop important d'intoxications à la colchicine, l'ANSM a demandé que la posologie utilisée en traitement curatif ou préventif de la goutte soit diminuée en conformité avec les recommandations des sociétés savantes, European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) et Société Française de Rhumatologie (SFR).

EVITONS LES ACCIDENTS

PRESCRIPTION

ADMINISTRATION

NOUVEAU SCHEMA POSOLOGIQUE

ACCES AIGU DE GOUTTE	
Jour 1 : Initier la colchicine le plus rapidement possible Dose de charge **1 mg** Suivie d'une heure plus tard de **0,5 mg**	**A partir du jour 2 :** **0,5 mg** 2 à 3 fois par jour*

* en fonction de l'évolution de la pathologie et de la survenue éventuelle de signes d'intolérance.

PROPHYLAXIE DES ACCES AIGUS DE GOUTTE CHEZ LE GOUTTEUX CHRONIQUE NOTAMMENT LORS DE L'INSTAURATION DU TRAITEMENT HYPO-URICEMIANT :		
Patients sans insuffisance rénale et/ou hépatique	Patients atteints d'insuffisance rénale et/ou hépatique légère à modérée	En cas d'effet indésirable et d'insuffisance rénale modérée :
0,5 mg à 1 mg par jour*	Commencer à 0,5 mg par jour	Réduire la posologie à 0,5 mg 1 jour sur 2

* en fonction de l'évolution de la pathologie et de la survenue éventuelle de signes d'intolérance.

INFORMATION PATIENT

Bien informer les patients est particulièrement important pour éviter les surdosages, en particulier
Pour chaque prescription ou dispensation de colchicine, vous devez :

- **Rappeler les risques de surdosage**
- **Rappeler les précautions d'emploi et de stockage**
- **Remettre les documents d'information**
- **Alerter sur les signes de surdosage, message d'alerte sur les boites**



- **Expliquer comment réagir** en cas de surdosage ou d'ingestion par une personne qui n'aurait pas dû prendre de colchicine

EN CAS DE SURDOSAGE

Contactez immédiatement un service d'urgence : 15 (SAMU), 18 (pompiers) ou 112 (toutes urgences : médicales, incendie, sécurité) ;

En cas de diarrhée, nausée ou vomissements, signes de surdosage potentiel en colchicine, le traitement par la colchicine doit être réduit ou arrêté

Sources : OMEDIT NAG ,ANSM