NEVER EVENT : Surdosage en LIDOCAINE

RISQUE

Cas de surdosages avec le médicament Xylocard 50mg/ml, utilisé exclusivement à l'hôpital pour corriger certains troubles du rythme cardiaque, dont un ayant conduit au décès. Certains de ces surdosages en Xylocard sont liés à une confusion entre la concentration en substance active et la quantité totale de substance active contenue dans la solution.

EVITONS LES ACCIDENTS

PRESCRIPTION

Xylocard 20 mg/ml

- Traitement et prévention des récidives des troubles du rythme ventriculaire menaçant le pronostic vital, notamment à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde
- Analgésie péri-opératoire en chirurgie abdominale par voie laparoscopique ou ouverte (telle que chirurgie colorectale, prostatectomie, cholécystectomie)

Xylocard 50 mg/ml

- Traitement et prévention des récidives des troubles du rythme ventriculaire menaçant le pronostic vital, notamment à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde.

ADMINISTRATION

Lire attentivement l'étiquette de tout médicament injectable avant son administration.

	XYLOCARD IV 20 mg/mL	XYLOCARD 50 mg/mL
Conditionnement	Ampoule de 5 mL	Flacon de 20 mL
Quantité totale de lidocaïne par conditionnement	100 mg dans 5 mL	1 000 mg dans 20 mL

INFORMATION PATIENT

L'administration de Xylocard est exclusivement réalisée en milieu hospitalier, en situation d'urgence et pour résoudre un problème ponctuel. Ainsi si du Xylocard vous a été administré, il n'y a pas de raison de vous inquiéter.

Changement d'étiquette en cours

Sources : OMEDIT NAG ,ANSM