# NEVER EVENT : NE PAS CONFONDRE
# LA VOIE ENTERALE ET LA VOIE INTRAVEINEUSE

## RISQUE

Les médicaments injectables ne peuvent pas tous être administrés par voie orale (ou voie entérale).
**Les médicaments destinés à la voie entérale peuvent même être fatals si administrés en voie intraveineuse.**
La présence d'une sonde entérale augmente le risque d'erreur voie IV/voie entérale.

## EVITONS LES ACCIDENTS

### PRESCRIPTION

- Préciser la voie d'administration sur les ordonnances

### STOCKAGE

- **Séparer les médicaments intraveineux** des médicaments destinés à la voie entérale
- **Etiqueter les localisations** de stockage de façon visible. Préciser la mention « **INTRAVEINEUX** ».
- **Circuits d'approvisionnement séparés**

**ENTERALE**

**IV**

### ADMINISTRATION

- **Bien lire les étiquettes**
- Utiliser les bons dispositifs médicaux (DM) :

Pour la voie entérale utiliser les dispositifs dit **« ENFit»** (répondant à la norme ISO 80369 visant à éviter les erreurs de raccordement des DM à application différente). Ainsi ces dispositifs ne permettent pas la connexion à une seringue avec IV par exemple.

- **Ne pas forcer les raccordements**. Faire un **double contrôle** des connexions
- Etiqueter les seringues **« voie entérale seulement »**
- Ne jamais mélanger sur le même plateau des seringues IV et des seringues pour administration entérale

*Sources : COREMEDIMS-OMEDIT-MIP, Norme ISO80369*

# NEVER EVENT : NE PAS CONFONDRE

# LA VOIE INTRATHECALE ET LA VOIE INTRAVEINEUSE

## RISQUE

Tous les médicaments injectables ne peuvent pas être administrés en voie intrathécale. **Les médicaments destinés à la voie intraveineuse peuvent être fatals si administrés en voie intrathécale.**

## EVITONS LES ACCIDENTS

### PRESCRIPTION

- Préciser la voie d'administration sur les ordonnances
- Voie intrathécale : contact direct avec le système nerveux central

### STOCKAGE

- **Séparer les médicaments intraveineux** des médicaments destinés à la voie intrathécale
- **Etiqueter les localisations** de stockage de façon visible. Préciser la mention « **INTRATHECALE** ».
- **Circuits d'approvisionnement séparés**

### INTRATHECALE

### IV

### ADMINISTRATION

- **Bien lire les étiquettes**
- Identification par code couleur jaune
- Utiliser les bons dispositifs médicaux (DM) :

Pour la voie intrathécale utiliser une **connexion aiguille avec détrompeur**. **Embase transparente** pour la visualisation du LCR et ergonomique pour une bonne préhension. Le **biseau pointe de crayon** réduit le diamètre de l'orifice de ponction limitant le risque de céphalées post-ponction. La distance entre l'orifice latéral et la pointe réduit le risque d'injection extra-durale et contribue à la qualité de l'analgésie

- Faire un **double contrôle** des connexions
- Ne **jamais mélanger** sur le même plateau des seringues IV et des seringues pour administration intrathécale
- **Dissocier dans les temps** les administrations intraveineuses et les administrations intrathécales.

*Sources : COREMEDIMS-OMEDIT-MIP, Norme ISO80369*