

chez un patient COVID+ hospitalisé

FT/GDR/0025/V3/2022

Date de mise en application : 17/01/2022

Les précautions STANDARD, l'hygiène des mains et le bionettoyage sont les garants de la prise en charge optimale de TOUS LES PATIENTS.

Rappel : en période d'épidémie COVID tous les soignants portent un masque chirurgical pour les contacts patients et un masque FFP2 en cas de gestes aérosolisants

NB : Pas de nécessité de 2ème PCR pour lever les précautions COVID

Patient symptomatique

Patient immunocompétent hospitalisé en secteur COVID MCO
(médecine, chirurgie, obstétrique)

- Patient immunodéprimé
 - Patient avec une forme grave
 - Patient hospitalisé en réanimation
- En secteur COVID**

Début des symptômes (DDS)

À DDS +8 jours, transfert possible en MCO non-COVID, SSR ou EPHAD

Si depuis 48 heures :

- Température $\leq 37^{\circ}8$
- O₂ $\leq 2l/mn$ pour maintien d'une SaO₂ $\geq 95\%$ au repos

Précautions COVID

DDS+ 14 jours

Levée des précautions COVID si pas de fièvre depuis 48h

Précaution STANDARD + mesures barrières

Début des symptômes (DDS)

À DDS +10 jours, transfert possible en MCO non-COVID, SSR ou EPHAD

Si depuis 48 heures :

- Température $\leq 37^{\circ}8$
- O₂ $\leq 2l/mn$ pour maintien d'une SaO₂ $\geq 95\%$ au repos

Précautions COVID

DDS +24 jours

Levée des précautions COVID

Précaution STANDARD + mesures barrières

Patient asymptomatique

Date du prélèvement positif (DDP)

Précautions COVID

DDP+ 10 jours

Levée des précautions COVID

Précaution STANDARD + mesures barrières