

NEVER EVENT : METHADONE : Erreur d'utilisation

RISQUE



Les signalements d'hospitalisations et de décès liés à un surdosage en méthadone chez les usagers de drogues continuant de progresser, nous rappelons les règles de bon usage de la méthadone qui permettent d'éviter ces surdosages.

EVITONS LES ACCIDENTS

PRESCRIPTION

Chlorhydrate de méthadone APHP et Méthadone AP-HP sont les médicaments à base de méthadone indiqués dans le traitement de substitution des pharmacodépendances majeures aux opioïdes, dans le cadre d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique chez les adultes et les adolescents de plus de 15 ans.

ADMINISTRATION

L'initiation d'un traitement par méthadone est une phase sensible

Le risque de surdosage est particulièrement important lors de la période d'initiation du traitement, période qui peut nécessiter une dispensation quotidienne.

La dispensation du sirop en récipient unidose est limitée à 14 jours.

Le patient devra être étroitement surveillé afin de détecter tout signe de dépression respiratoire et de sédation.

Une surveillance clinique, électrolytique et ECG est également nécessaire pour les patients présentant un risque d'allongement de l'intervalle QT.

INFORMATION PATIENT

Bien informer les patients est particulièrement important pour éviter des surdosages, en particulier :

- Les patients qui ne consomment pas ou peu d'opioïdes (dose létale : 1 mg/kg)
- A l'initiation du traitement
- Après un arrêt (même court) ou une diminution des doses.

Pour chaque prescription ou dispensation de méthadone, vous devez :

- Rappeler les risques de surdosage et de décès
- Rappeler les précautions d'emploi et de stockage
- Remettre les [documents d'information](#)
- Alerter sur les signes de surdosage
- Expliquer comment réagir en cas de surdosage ou d'ingestion par une personne qui n'aurait pas dû prendre de méthadone
- utilisable par les usagers ou leur entourage en l'absence d'un professionnel de santé. Une administration répétée peut parfois être nécessaire.

EN CAS DE SURDOSAGE

Contactez immédiatement un service d'urgence : 15 (SAMU), 18 (pompiers) ou 112 (toutes urgences : médicales, incendie, sécurité) ;

Administrez-lui de la naloxone et maintenez-la éveillée jusqu'à l'arrivée des secours :

A partir de 14 ans, vous pouvez utiliser de la naloxone en solution pour pulvérisation

ANTIDOTE : Prescrire ou proposer un kit de naloxone prête à l'emploi. La naloxone, antidote des surdosages aux opioïdes est disponible sous forme de kit prêt à l'emploi facilement